

UZUPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA DLA HODOWCÓW ŚWIŃ

wg Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz.U.U.E.L.2021.129.1 z dnia 2021.04.15).

Wymagania weterynaryjne wprowadzone w nowym ww. rozporządzeniu oparte są na już istniejących zasadach bioasekuracji poza 2 nowymi elementami:

- po pierwsze konieczność **ogrodzenia** minimum budynków, gdzie utrzymywane są świny, przechowywana jest pasza i ściółka dla świń;
- po drugie posiadanie tzw. „**Planu bezpieczeństwa biologicznego**”, zawierającego opis podstawowych czynności jakie podejmuje się w gospodarstwie w celu ochrony przed wnikaniem wirusów ASF:

Plan ten zawiera znane już wymagania jak konieczność zmiany obuwia i ubrania roboczego przy wejściu do budynków inwentarskich, jak i nowe w brzmieniu ale znane już wcześniej zasady podziału na tzw. strefę czystą, czyli budynki gdzie przebywają świny i przechowywana jest pasza oraz strefę brudną – podwórko, magazyny sprzętu rolniczego, część socjalna gospodarstwa, gdzie mogą przychodzić osoby z zewnątrz.

Nie przewiduje się nagłej egzekucji ww. nowych zasad.

Nowe przepisy przewidują także wprowadzenie ułatwień jeżeli chodzi o możliwość przemieszczania świń z gospodarstw zlokalizowanych w obszarach występowania ASF poza te strefy, warunkując to spełnieniem wszystkich wymagań weterynaryjnych.

AKTUALNA KOLORYSTYKA OBSZARÓW OBJĘTYCH OGRANICZENIAMI W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM ASF wg Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz.U.U.E.L.2021.129.1 z dnia 2021.04.15).

W załączniku I do ww. rozporządzenia określone zostały **obszary objęte ograniczeniami I, II, III**, które odpowiadają dotychczasowym w sposób następujący:

- **obszar objęty ograniczeniami I** to dotychczasowy obszar ochronny („strefa żółta”);
- **obszar objęty ograniczeniami II** to dotychczasowy obszar objęty ograniczeniami („strefa czerwona”);
- **obszar objęty ograniczeniami III** to dotychczasowy obszar zagrożenia („strefa niebieska”).

W związku z wejściem w życie nowych przepisów **zmieniło się oznaczenie barwne obszarów** na mapie udostępnionej na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii, dostępnej **pod linkiem: <https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/>**

- **obszar objęty ograniczeniami I** jest oznaczony kolorem **niebieskim** (dawniej obszar ochronny - strefa żółta);
- **obszar objęty ograniczeniami II** jest oznaczony kolorem **różowym** (dawniej obszar objęty ograniczeniami - strefa czerwona);
- **obszar objęty ograniczeniami III** jest oznaczony kolorem **czerwonym** (dawniej obszar zagrożenia - strefa niebieska).

DODATKOWE ZALECENIA W ZWIĄZKU Z PRACAMI POLOWYMI

**w celu wykluczenia możliwości przeniesienia ASF z pól do stada świń
(w tym poprzez maszyny rolnicze i płody rolne).**

W związku z niepomyślną sytuacją, w zakresie szerzenia się afrykańskiego pomoru świń – ASF, szczególnie w populacji dzików, konieczne jest stałe przestrzeganie wszystkich obowiązujących zasad bioasekuracji hodowli świń, a ponieważ prowadzenie prac na polach uprawnych zwiększa niebezpieczeństwo przeniesienia choroby do gospodarstwa za pośrednictwem maszyn rolniczych oraz osób je obsługujących, w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną hodowcy powinni w szczególności sposób zadbać o oczyszczenie i dezynfekcję maszyn rolniczych, używanych do prac polowych, należy zdawać sobie sprawę, że przejazd przez maty dezynfekcyjne położone we wjeździe do gospodarstwa, nie zagwarantuje pełnego zdezynfekowania traktora lub innej maszyny rolniczej, użytej do pracy polowej.

Osoby obsługujące maszyny rolnicze po powrocie z pola do gospodarstwa, powinny zmienić odzież oraz poddać się myciu i dezynfekcji aby nie przenieść ASF do chlewni.

Należy przeanalizować lokalizację miejsca składowania i mycia maszyn i polowego sprzętu rolniczego pod kątem stwarzanego zagrożenia i bliskości budynków, w których utrzymuje się świnie.

Ze względu na wysokie ryzyko rozprzestrzeniania choroby, szczególną ostrożność należy zachować przy wprowadzaniu do gospodarstwa utrzymującego trzodę chlewną paszy lub podściółki pochodzącej z terenów występowania ASF u dzików – aktualnie województwo lubuskie oraz w województwie wielkopolskim powiat szamotulski, wcześniej wolsztyński oraz częściowo grodziski i leszczyński.

Właściciele gospodarstw ponoszą pełną odpowiedzialność za skuteczne, zabezpieczenie swoich hodowli świń, przed zawleczeniem wirusa ASF.

Nieprzestrzeganie wymienionych wyżej zaleceń powoduje wzrost zagrożenia afrykańskim pomorem świń.

Nowy Tomyśl, 05 maja 2021 r.